

ジエース登録内容

平成 30 年 9 月現在

水溶剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かき	カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1500倍	200～700 ℓ/10a	収穫 45 日前まで 収穫 45 日前まで	2回以内 1回	2回以内	
いちじく	アザミウマ類	2000倍			1回		
キャベツ	ハスモンヨトウ、アオムシ、コナガ ヨトウムシ、アブラムシ類 タマナギンウワバ	1000～1500倍			2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)		
はくさい	ハスモンヨトウ、アオムシ、コナガ ヨトウムシ、アブラムシ類	1500倍			1回		
レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍			3回以内		
非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫 14 日前まで	1回	散布	
カリフラワー	ヨトウムシ						
チンゲンサイ	アブラムシ類	1500倍		収穫 21 日前まで	1回		
みずな				収穫開始 7 日前まで			
オクラ	アブラムシ類、フタテンミドリヒメヨコバイ			収穫 30 日前まで			
ほうれんそう	アブラムシ類			収穫 7 日前まで	2回以内		
にんにく	ネギガガ、アブラムシ類			収穫 45 日前まで	1回		
やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ						
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニジウヤホシテントウ アブラムシ類	1000～2000倍 300倍	250ℓ/10a	収穫 30 日前まで 収穫 21 日前まで	2回以内 5回以内	散布	
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500倍	100～300 ℓ/10a	収穫 45 日前まで	3回以内		
てんさい	ヨトウムシ テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	300倍 1000倍	250ℓ/10a 100～300 ℓ/10a	収穫 21 日前まで	5回以内		
	テンサイトビハムシ	60～100倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ (3ℓ/m ²)	育苗期	1回	灌注	
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍 1000～1500倍	200～400 ℓ/10a	摘採 45 日前まで	1回		
だいす	アブラムシ類、ハスモンヨトウ			収穫 60 日前まで	3回以内		
ごぼう	アブラムシ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫 45 日前まで	1回		
あずき	ノメイガ類、アブラムシ類			収穫 14 日前まで	3回以内		
いんげんまめ	アブラムシ類						
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ、アブラムシ類	1500～2500倍	25～180 ℓ/10a	収穫 10 日前まで	2回以内	散布	
つつじ類	ツツジグンバイ	1500倍					
つばき類	チャドクガ						
さくら	アメリカシロヒトリ モンクロシャチホコ	1500～2000倍 1000～1500倍	200～700 ℓ/10a	発生初期	5回以内		
ばら	アブラムシ類 アザミウマ類	1000倍	100～300 ℓ/10a				
きく	アブラムシ類、アザミウマ類 マメハモグリバエ、オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	アブラムシ類、アザミウマ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	発生初期	1000倍	100～300 ℓ/10a	5回以内
	スジキリヨトウ、シバツツガ					0.3ℓ/m ²	
	タマナヤガ					0.3～0.5ℓ/m ²	
	シバオサゾウムシ成虫					0.3～1ℓ/m ²	

粒 剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)
はくさい					株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)	は種前		作条散布	
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	3～4kg/10a	定植時		株元散布	
かぶ		4kg/10a	収穫 21 日前まで		土壤混和処理	1回
なばな	アブラムシ類	6kg/10a (2g/株)	定植時		作条散布 又は植穴処理	
きゅうり	オンシツコナジラミ、アブラムシ類 アザミウマ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		株元散布	2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内)
トマト	アブラムシ類、オンシツコナジラミ				作条散布後土壤混和	1回
なす	アブラムシ類、オンシツコナジラミ アザミウマ類				作条散布	3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
ごぼう	アブラムシ類	3～6kg/10a	収穫 75 日前まで		作条散布	1回
みずな		6kg/10a	定植時		株元散布	2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内)
ばれいしょ	アブラムシ類				作条散布後土壤混和	1回
こまつな					作条散布	3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
チンゲンサイ					作条散布後土壤混和	1回
たばこ	ヨトウムシ、アブラムシ類		移植前		作条散布後土壤混和	2回以内
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	アブラムシ類	1～2g/株(但し、9kg/10aまで)				
	アザミウマ類	2g/株(但し、9kg/10aまで)				
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、マメハモグリバエ	6～9kg/10a				
	アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株(但し、9kg/10aまで)				
トルコギキョウ	アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株(但し、9kg/10aまで)				
つつじ類	ツツジグンバイ	2g/株				
芝	スジキリヨトウ、シバツツガ タマナヤガ	10kg/10a 5～10kg/10a			全面散布	5回以内

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。