


家庭園芸用肥料



バイオ エドレンス[®]L

シイタケ菌糸体抽出物入り



包装 500mℓボトル×10本／ケース

発根促進

健全育成

品質向上

特長

生育促進

なりづかれ
防止

肥大促進

保証成分量

窒素全量 1%
りん酸 1%
加里 1%

内容成分

肥料成分
シイタケ菌糸体抽出物
ビタミンB1
ビタミンB6
L-システイン 等



家庭園芸用肥料 バイオエドレンスL[®]

■バイオエドレンスLの使い方

作物	使用目的	使用時期	希釗倍率(倍)	使用量	使用方法
稻	発根促進 生育促進	播種時	500	500ℓ／箱	灌水
芝生 (日本芝・西洋芝)	活着促進	移植時	1,000	150ℓ／10a	灌水
	発根促進 生育促進	春～夏 生育期	500	500ℓ／10a	葉面散布(3回)
い　ち　ご	ランナー促進	親株時	500～1,000	100～150ℓ／10a	葉面散布(2回)
	活着促進	定植時	1,000	100～150mℓ／株	灌水
	生育促進	生育期	500～1,000	100～150ℓ／10a	葉面散布(2・3回)
	なりづかれ防止	収穫中期～			葉面散布
メロン すいか	活着促進	定植時	1,000	100～150mℓ／株	灌水
	健全育成	生育期	500～1,000	150～200ℓ／10a	葉面散布(2・3回)
きゅうり トマト なます	活着促進	定植時	1,000	100～150mℓ／株	灌水
	健全育成	生育時	500～1,000	100～150ℓ／10a	葉面散布(3回)
	なりづかれ防止	収穫中期～			葉面散布
ピーマン	肥大促進 品質向上	球肥大期	500～1,000	150～200ℓ／10a	葉面散布(2・3回)
	ながいも やまといも	植え付け 2ヶ月後～			葉面散布(3回)
		4～8葉期 および着蕾期			
茶樹	生育促進	萌芽期			葉面散布(2・3回)
果樹類	花芽充実	着蕾前	1,000	20ℓ／株	灌水
	肥大促進	交配後～6月	500～1,000	100～150ℓ／10a	葉面散布(3回)
	樹勢向上	収穫後	1,000		葉面散布(1・2回)
花卉	活着促進	移植時	1,000	100～150mℓ／株	灌水
	健全育成	生育期	500～1,000	100～150ℓ／10a	葉面散布(2・3回)
花木	活着促進	移植時	1,000	200～300mℓ／株	灌水
	健全育成	生育期	500～1,000	150～200ℓ／10a	葉面散布(3回)

■使用上の注意事項

- 用法・用量を守って適期に使用してください。
- 葉面散布のときは、展着剤を加用してください。
- 強アルカリ性の薬剤とは絶対混用しないでください。特に石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガス(硫化水素ガス)の発生するおそれがあり、危険ですから混用は行わないでください。
- 沈殿を生じることがありますが、効果への影響はありません。
- 使用前は冷暗所に保管してください。使用後は密栓して冷暗所に保存し、なるべく早く使い切ってください。
- 本剤は肥料ですので、飲用することはできません。



野田食菌工業株式会社

〒278-0051 千葉県野田市七光台295
TEL 04-7127-3811 FAX 04-7127-3857
お客様問合せ ☎0120-06-0434

取扱店

2016年2月作成