



雑草にお困りなら

除草剤 エイトアップ[®] 液剤

8

根までしっかり枯らします。

【農林水産省登録 第18815号】

500ml 1本で約150坪(500㎡)以上散布できます。

●有効成分 グリホサートイソプロピルアミン塩…41.0% 水・界面活性剤等…59.0%

豊富なバリエーション



樹木周りにも使えます。



散布前



散布後

強力!しかも環境にやさしい



散布前



散布後

水で薄めて散布するだけ



残留や土壌汚染がないので、
枯れた後に種まき、苗の植付けも可能です。

希釈液の作り方(※キャップ容量:10mlです。)



通常
100倍
希釈



茎太類・広葉類
50倍
希釈



スギナには
25倍
希釈



※ササ・ススキは30倍希釈 水1L エイトアップ30ml

環境にやさしい除草剤

【使用方法】

	通常	茎太・広葉	スギナ	散布面積
倍率	100倍	50倍	25倍	
水量	エイトアップの量			
1L	10ml	20ml	40ml	3坪・10㎡
4L	40ml	80ml	160ml	12坪・40㎡
5L	50ml	100ml	200ml	15坪・50㎡
6L	60ml	120ml	240ml	18坪・60㎡
10L	100ml	200ml	400ml	30坪・100㎡

【使用場所】

庭・駐車場・公園・宅地・道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等


農耕地:

野菜類・麦類・豆類・いも類 (は種・定植前の雑草処理)

果樹類 (樹幹周りの雑草処理)

水田 (耕起前、刈跡、畦畔などの雑草処理)

根まで枯らし土にも安心



散布器具により 散布面積は変わります。

希釈液1Lでの散布可能な面積



ジョーロ

3坪 10㎡



噴霧器

7.5坪 25㎡



少量散布ノズル

9坪 30㎡

環境に配慮したエコロジー設計

大きく使ってゴミは小さく



容器を持ち上げずらくく小分け計量ができます。



エイトアップ®液剤は、安心・安全・安価なジェネリック除草剤です。

発売元



株式会社 シー・ジー・エス

〒369-1245 埼玉県深谷市荒川909

TEL (048)579-0451 / FAX (048)579-0455

http://www.cgs-inc.co.jp

お客様相談センター

0120-091-611

平日/月～金曜日 9:00～17:00(左記以外は音声による簡易説明となります。)

お求めは

有限会社チャレンジサービス

〒369-1245 埼玉県深谷市荒川 909

TEL 048 (584) 2401

FAX 048 (579) 0455

HP http://www.8up.jp

除草剤 エイトアップ[®] 液剤 8 ご注文書

商品ラインナップ



【有効成分】 ●グリホサートイソプロピルアミン塩...41.0% ●水・界面活性剤等...59.0%

エイトアップ 代引価格表(税込)

★計量カップサービス ご注文時にお申し付け下さい

容 量	規 格	価 格	送 料	ご注文数
500ml	4本セット	4,980 円	別途要	セット
500ml	8本セット	9,600 円	別途要	セット
500ml	1ケース(20本入り)	21,600 円	送料サービス	ケース
1ℓ	1ケース(12本入り)	25,440 円	//	ケース
2ℓ	1ケース(6本入り)	24,960 円	//	ケース
2ℓエコパック	1ケース(6袋入り)	24,480 円	//	ケース
5ℓ	1ケース(3本入り)	29,900 円	//	ケース
5ℓエコbox	1ケース(3箱入り)	29,900 円	// コック付き	ケース
10ℓ	1本	19,600 円	// コック付き	本
18ℓ	1本	34,560 円	// コック付き	本
200ℓ	1本	295,000 円	// 手動ポンプ付き	本

※2022年4月1日より価格改定となりました。 ※200Lは納入時にフォークリフトが必要です。

運賃について(税込)

東北・関東・甲信・東海・北陸・近畿・中国・四国	600 円
北海道・九州	800 円
沖縄	1,550 円

※離島につきましては別途料金となります。 お支払い方法は佐川急便代金引換サービスとなります。(現金のみ)

お名前	会社名(法人の方)
ご住所 〒	
お電話番号	ご連絡先携帯番号



FAXでのご注文

048-579-0455



お電話でのご注文
平日/月~金 9時~17時

048-584-2401



インターネット
からのご注文

<http://www.8up.jp>



適用場所、適用雑草および使用量（農薬取締法による表記）



作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量(mL)	希釈水量(L)					
果樹類(かんきつを除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布 50~100	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内		
		多年生雑草		500~1000						
かんきつ		マルバツユクサ		1000~2000	100			通常散布 50~100 少量散布 25~50	5回以内	
		スギナ		2000						
		一年生雑草		250~500	2回以内					3回以内
		多年生雑草		500~1000						
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	2回以内	3回以内			
	多年生雑草	500~1000								
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	2回以内	3回以内			
	多年生雑草	500~1000								
水田作物(水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	1回	1回			
	多年生雑草	500~1000								
水田作物(水稲を除く)	—	一年生雑草	耕起20~10日 前まで(雑草生育期)	250~500	50	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内		
移植水稲			は種30日前~ 出芽前(雑草生育期) (乾田耕起栽培)							
直播水稲										
麦類(小麦を除く)		多年生雑草		500~750	50~100	3回以内		3回以内		
小麦						3回以内		3回以内		
雑穀類		一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500	100	1回		1回		
野菜類(だいこん、えだまめ、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、いも類、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なす、アスパラガス、オリーブ(葉)、たらのき、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、とうがらし類、にんじん、ピーマン、薬用にんじんを除く)						1回		2回以内		
とうがらし類 にんじん、ピーマン、だいこん						2回以内		3回以内		
アスパラガス、オリーブ(葉)、たらのき、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、トマト、きゅうり、なす						3回以内		10回以内 (1年間に 2回以内)		
しゃくやく(薬用)						3回以内		3回以内		
薬用にんじん						3回以内				
ねぎ						収穫14日前まで (雑草生育期: 定植後畦間処理)			少量散布 25~50	3回以内
たまねぎ						耕起7日前まで (雑草生育期)		50~100	3回以内	
						耕起又は定植7日前 まで(雑草生育期)		100		
					少量散布 25~50					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量(mℓ)	希釈水量(ℓ)			
えだまめ	—	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500	100	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)			は種後出芽前 (雑草生育期)		少量散布 25~50			
			だいず			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)		4回以内
かんしょ			は種10日以前 (雑草生育期)		100	1回		
			いも類(かんしょを除く)					は種後出芽前まで (雑草生育期)
茶			耕起前(雑草生育期)		少量散布 25~50	2回以内		
さとうきび			耕起前又は種付前まで (雑草生育期)					6回以内
			圃場内の 周縁部		摘採7日前まで (雑草生育期)	2回以内		
多年生雑草					収穫30日前まで (雑草生育期)			500~1000
飼料用とうもろこし			—		一年生及び 多年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)		
	は種後出芽前まで (雑草生育期)							
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の 10日以前 (雑草生育期)	250~500	50	2回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草	は種10日前~ は種当日(耕起整地後) (雑草発生前期)	500~1000				
		一年生及び 多年生雑草	250~500					
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草、 落葉雑草かん木	生育盛期以降 (夏~秋期)	1000	30	1回	雑草木 茎葉散布	1回
樹木類	—	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道等	多年生雑草		500	100	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布	3回以内
		スギナ		1000				
				2000				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ・フジ等の つる類	生育初期	原液又は 2倍液	つる径(cm) 2cm以下 2.1~3.0cm 3.1~4.0cm 4.1~5.0cm 5.1cm以上	1回	つる注入 処理	1回
			生育期 (5月~10月)		1mL/ヶ所 樹径(cm) 10cm以下 10~20cm 20cm以上		立木注入 処理	
		落葉雑草かん木			カ所数 2~3 4~8 10			
	林地、放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10mL/本		竹桿注入処理	

- 面積** 10アール=300坪=1,000㎡
- 一年生雑草** 雑草の種が落ち育成し、一年以内に枯れるもの。
- 多年生雑草** 雑草の種が落ち育成し、越冬し翌年も生えるもの。
- 樹木等** 植木や街路樹など植えてある周辺。
- 少量散布** 少量散布用ノズルを装着する事で、泡状になって雑草に付着するので散布水量を大幅に減らす事ができる。
- つる注入処理** つるにナタなどで傷をつけ又はドリルで穴をあけ、油差しなどで注入して下さい。

2021年12月以降
最新の登録内容はこちらで

